

Grandes cultures

Le 27 Juin 1990

N° 11

MAIS

Pyrale : Intervenir du 2 au 10 Juillet

MAIS

Stade : 10 à 12 feuilles

PYRALE

★ Situation

- Cage d'élevage de Marmilhat : premiers papillons le 15 Juin - Activité modérée actuellement.
- Piégeages sexuels : premières captures le 18 Juin à SAINT-BABEL (63) et le 25 Juin à COGNAT-LYONNE (03).


★ Préconisation

En fonction de nos différentes observations et avec la collaboration de LIMAGRAIN, il faut prévoir d'intervenir avec les microgranulés au cours de la période du 2 au 10 Juillet 1990.


Utiliser une spécialité en formulation microgranulé. Consulter le dépliant SPV-AGPM (Protection du Maïs).

Il est à noter le risque de pullulations de pucerons avec l'utilisation de pyréthrinoïdes liquides. Ils sont donc déconseillés.

© SPV 1990 - Toute reproduction même partielle est soumise à notre autorisation.



LEGENDE



Population larvaire :
1 à 3 larves par pied.
TRAITEMENT IMPERATIF.



Population larvaire
0,5 à 1 larve par pied.
TRAITEMENT EN MAIS SEMENCE
et MAIS A HAUT POTENTIEL.



Population larvaire
moins de 0,5 larve par pied.
TRAITEMENT NON JUSTIFIE.

